Tutorium Mathe 2 MT

Aufgabenblatt: Differentialgleichungen 1. Ordnung (+ Lösungen)

1) Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$(x+1-2y-y^2)e^x-2(y+1)e^xy'=0;$$
 $y(0)=1.$

Es liegt eine exakte DGL vor, die entsprechend der Regeln berechnet werden kann.

$$P(x,y) = (x+1-2y-y^2)e^x$$

 $Q(x,y) = -2(y+1)e^x$

$$P_y(x, y) = (-2y - 2)e^x$$

 $Q_x(x, y) = (-2y - 2)e^x$

 \rightarrow Es existiert ein Potenzial, weil $P_y(x,y) = Q_x(x,y)$.

$$F(x,y) = \int P(x,y) dx = (x+1-2y-y^{2})e^{x} - \int e^{x} dx$$

$$= x \cdot e^{x} + e^{x} - 2y \cdot e^{x} - y^{2} \cdot e^{x} - e^{x} + C(y)$$

$$C(y) = F(x,y) - x \cdot e^{x} + 2y \cdot e^{x} + y^{2} \cdot e^{x}$$

$$C'(y) = F_{y}(x,y) + 2y \cdot e^{x} + 2 \cdot e^{x} = -2y \cdot e^{x} - 2 \cdot e^{x} + 2y \cdot e^{x} + 2 \cdot e^{x} = 0$$

$$\Rightarrow C(y) = const. \Rightarrow C(y) = 0 (Annahme!!)$$

$$x \cdot e^{x} - 2y \cdot e^{x} - y^{2} \cdot e^{x} = c$$

$$y^{2} + 2y - x + c \cdot e^{-x} = 0$$

$$y_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 + x - c \cdot e^{-x}}$$

$$y = -1 + \sqrt{1 + x - c \cdot e^{-x}}$$

Einsetzen des AWP:

$$1 = -1 + \sqrt{1 - c}$$
$$2 = \sqrt{1 - c}$$
$$-3 = c$$

Die Lösung des AWP lautet:

$$y = -1 + \sqrt{1 + x + 3 \cdot e^{-x}}$$

2) Bestimmen Sie die Lösung der Differentialgleichung $y' = e^{-y+2\ln(x)}$ mit der Anfangsbedingung y(3) = 2 .

Es liegt nach kleinen Umformungen eine DGL vom Typ "Trennung der Veränderlichen" vor.

$$y' = e^{-y} \cdot e^{\ln(x^2)} = e^{-y} \cdot x^2$$

$$e^y \cdot y' = x^2$$

$$\int e^y dy = \int x^2 dx$$

$$e^y = \frac{x^3}{3} + c$$

$$y = \ln\left(\frac{x^3}{3} + c\right)$$

Einsetzen des AWP:

$$e^2 = \frac{27}{3} + c$$

 $e^2 - 9 = c$

Die Lösung des AWP lautet:

$$y = \ln\left(\frac{x^3}{3} + e^2 - 9\right)$$

3) Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$y' = \frac{1}{xy} \left(y^2 - x\sqrt{x^2 + y^2} \right); \quad y(1) = 1.$$

Zunächst muss man die DGL umformen, um den Typ der DGL erkennen und die entsprechenden Berechnungsschritte durchführen zu können.

$$y' = \frac{y^2}{xy} - \frac{x\sqrt{x^2 + y^2}}{xy}$$

$$= \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y}$$

$$= \frac{y}{x} - \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{y^2}}$$

$$= \frac{y}{x} - \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{y^2}}$$

$$= \frac{y}{x} - \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{y^2}} + 1 \rightarrow Typ : homogen in x und y$$

Die Lösung des AWP lautet:

$$y = x\sqrt{\sqrt{-\ln(|x|) + 4} - 1}$$

4) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y' = \frac{x + 2y}{x}.$$

Auch diese DGL muss zunächst umgeformt werden, damit erkennbar wird, welchem Typ sie entspricht.

$$y' = 1 + \frac{2y}{x} \rightarrow homogen in x und y$$

$$z + x \cdot z' = 1 + 2z$$

$$\frac{1}{1+z} \cdot z' = \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{1+z} dz = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln(|1+z|) = \ln(|x|) + c$$

$$1 + z = x \cdot e^{c}$$

$$z = x \cdot C - 1$$

$$y = x \cdot (x \cdot C - 1)$$